aspire

GOTEK NANO

User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
For optimal performance, only use your eLiquids with original charger, battery components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, and accessories that are not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from children and unattended/untrained persons (<18 / 21 yrs).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of the device, as it may cause overheating or injury.

To avoid inadvertently activation, always turn off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
Do not touch the coil or wick with your fingers. Do not drink or eat things (e.g. coil) that could burn, stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-removable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged label. Do not use batteries that have been dropped or fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the household waste. Please dispose of the product and its components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding or suffering from a relatively severe cardiovascular disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product. If the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Contents:
1* Gotek Nano Device
1* Gotek Pod (2.0 mL 0.6Ω)
1* Type-C Cable
1* User Manual

Components View:

Specifications:
Dimensions: 80.5*17.2*20 mm
Capacity: 2.0 mL
Coil: 0.6ohm Mesh non-replaceable
Pod Compatibility: Compatible with Gotek Pods (1.8Ω / 0.8Ω) and pod-like Gotek Pod 1.0Ω
Airflow: Adjustable bottom airflow
Fill: Top-fill system
Battery Capacity: Built-in 1000 mAh
Output: Constant 5.4W output
Activation: Auto-draw
Charging Port: Type-C
Maximum Charge Current: 1A

Pod Filling:
1. Remove the pod from the device
2. Fill via the side silicone seal, fill the e-liquid into the pod directly
3. Close the silicone seal
4. Put the pod into groove joint of the device

Remember to clean the condensation between the pod and the device.



Instructions:

Device Condition	Status of Indicators & Details
Turn on / off	Quickly press the power button 5 times, the screen will flash the current battery level and ✔ icon.
Connect the pod	The screen will display the current battery level and ⚡ icon.
Lock / unlock	The device enters a locked state after 7s continuous working. Quickly press the power button 5 times to unlock.
Fully charged	The screen will be on for 5s and then turn off.
Charging	The charging voltage is over 5.1V to keep 1 min.
	The charging voltage is over 5.1V to keep 1 min & 0V.
	The device will stop charging, the screen will be on for 5s.
Type-C cable	The screen will display the current battery level and ⚡ icon.
If you keep while charging, the battery will stop charging to ensure safety.	

Safety Features:

Vaping Over-Time Protection (Ots)	The screen will flash "TO / 0" 10 times.
Short Circuit Protection	The screen will flash "ISE" ✔ icon and "R" icon 3 times.
Low Voltage Protection	The screen will flash ✔ icon and "LV" before device turns off 10 times.
Over voltage Protection	The device will stop charging and vaping is not allowed.
Overcharge Protection	The screen will be on for 5s and then shut off.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID
If used with nicotine containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in small children.

Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
- Nicotine containing e-liquid is not recommended for:
- Non-smokers
- Young people under the legal age;
- Pregnant or breast-feeding women, as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk.

3. CONTRAINDICATIONS
Nicotine may aggravate several ill health, such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma.

- Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure).
- Those who have diabetes, nicotine may affect your insulin requirements.
- Those taking the following medication:
* Theophylline (to treat breathing problems)
* Rapinirole (to treat restless leg syndrome)
* Clozapine (to treat schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Nicotine can have a much routine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
- Feeling faint
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Dizziness
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomiting
- Arrhythmias in the chest

5. PREGNANCY AND BREAST-FEEDING
- Pregnant, dis-ease Liberation Syndrome Use oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Insulinbedarf verändern kann;
- Personen, welche folgende Medikamente einnehmen:
* Theophyllin (zur Behandlung von Atemproblemen)
* Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie).

6. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Insulinbedarf verändern kann;
- Personen, welche folgende Medikamente einnehmen:
* Theophyllin (zur Behandlung von Atemproblemen)
* Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie).

7. PRÄVENTION NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

8. PROBLEMLÖSUNG
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Insulinbedarf verändern kann;
- Personen, welche folgende Medikamente einnehmen:
* Theophyllin (zur Behandlung von Atemproblemen)
* Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie).

9. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

10. PROBLEMLÖSUNG
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

- Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure).
- Those who have diabetes, nicotine may affect your insulin requirements.
- Those taking the following medication:
* Theophylline (to treat breathing problems)
* Rapinirole (to treat restless leg syndrome)
* Clozapine (to treat schizophrenia)

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Nicotine can have a much routine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
- Feeling faint
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Dizziness
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomiting
- Arrhythmias in the chest

5. PREGNANCY AND BREAST-FEEDING
- Pregnant, dis-ease Liberation Syndrome Use oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Insulinbedarf verändern kann;
- Personen, welche folgende Medikamente einnehmen:
* Theophyllin (zur Behandlung von Atemproblemen)
* Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie).

6. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

7. PREVENTION SIDE EFFECTS
Nicotine can have a much routine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
- Feeling faint
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Dizziness
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomiting
- Arrhythmias in the chest

8. PROBLEM SOLVING
Nicotine can have a much routine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
- Feeling faint
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Dizziness
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomiting
- Arrhythmias in the chest

9. POSSIBLE SIDE EFFECTS
Nicotine can have a much routine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
- Feeling faint
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Dizziness
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomiting
- Arrhythmias in the chest

10. PROBLEM SOLVING
Nicotine can have a much routine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
- Feeling faint
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Dizziness
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion
- Vomiting
- Arrhythmias in the chest

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NICOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie folgende Informationen sorgfältig lesen.

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID:
Wenn nikotinhaltige E-Liquids verwendet wird, sollte man wissen, dass Nikotin eine sucht machtig, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei kleinen Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe des E-Liquids allergisch sind (siehe das Herstellerlabel für Einzelheiten).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
- Nikotinhaltiges E-Liquid wird nicht empfohlen für:
- Nichtraucher
- Personen, denen das gesetzlich zulässigen Alter
- Schwangerschaft- oder Stillende Frauen, da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird.

3. KONTRAINDIKATIONEN
- Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden, wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre, Leber- oder Nierenkrankheiten, chronischen Halserkrankheiten, bei Atembeschwerden wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma.

- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Insulinbedarf verändern kann;
- Personen, welche folgende Medikamente einnehmen:
* Theophyllin (zur Behandlung von Atemproblemen)
* Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie).

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

5. KONTRAINDIKATIONEN
- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Insulinbedarf verändern kann;
- Personen, welche folgende Medikamente einnehmen:
* Theophyllin (zur Behandlung von Atemproblemen)
* Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie).

6. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

7. VERHINDERUNG NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

8. PROBLEMLÖSUNG
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

9. PROBLEMLÖSUNG
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

10. PROBLEMLÖSUNG
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

Lieferumfang:
1* Gotek Nano Akku
1* Gotek Pod 6.5 Ω
1* USB-Type C-Kabel
1* Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts:

Spezifikationen:
Maße: 80.5*17.2*20 mm
Kapazität: 2.0 ml
Coil: 0.6ohm Mesh, nicht auswechselbar
Pod-Kompatibilität: Kompatibel mit nachfüllbaren Gotek Pods (1.8Ω / 0.8Ω) und Pod-ähnlichen Gotek Pod 1.0Ω
Luftstrom: Einstellbarer Bodenluftstrom
Füllung: Seitenfüllsystem
Akkukapazität: 1000 mAh
Ausgabeleistung: Konstante Voltage (konstante Spannung) abgabe 5.4V
Aktivierung: Zugaktivierung
Ladeanschluss: Type-C
Maximale Ladestromstärke: 1A

Einfüllen des Liquids:
1. Entnehmen Sie den Pod aus dem Gerät
2. Füllen Sie das Liquid durch die Seitenöffnung an der side
3. Schließen Sie nach dem Befüllen die Seitenöffnung
4. Setzen Sie den Pod wieder in das Gerät ein

Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen.

Anweisungen:

Gerätestatus	Status der Indikatoren & Details
Einschalten Ausschalten	Drücken Sie die Taste 5 Mal schnell, auf dem Bildschirm wird der aktuelle Batteriestand und ✔ angezeigt.
Pod anschließen	Auf dem Bildschirm wird der aktuelle Batteriestand und ⚡ angezeigt.
Sperren/Entsperren	Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn es 7 Sekunden lang benutzt wird. Drücken Sie den Pod 5 Mal schnell, um es zu entsperren.
Aufladen	Der Bildschirm zeigt den aktuellen Batteriestand und ⚡ an.
	Wenn die Spannung beim Laden zu hoch ist, stoppt der Akku den Ladevorgang, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Sicherheitsfunktionen:

E-Zigaretten-Automatisch (OTS)	Auf dem Bildschirm blinkt "TO / 0" 10 Mal.
Kurzschlussschutz	Auf dem Bildschirm erscheint "ISE" ✔ und "R" 3 Mal.
Unterspannungsschutz	Auf dem Bildschirm erscheint "LV" ✔ und vor dem Ausschalten des Geräts 10 Mal.
Überspannungsschutz	Das Gerät kann nicht aufgeladen werden.
Überladeschutz	Auf dem Bildschirm wird "5" angezeigt.

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NICOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie folgende Informationen sorgfältig lesen.

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID:
Wenn nikotinhaltige E-Liquids verwendet wird, sollte man wissen, dass Nikotin eine sucht machtig, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei kleinen Kindern.

Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe des E-Liquids allergisch sind (siehe das Herstellerlabel für Einzelheiten).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
- Nikotinhaltiges E-Liquid wird nicht empfohlen für:
- Nichtraucher
- Personen, denen das gesetzlich zulässigen Alter
- Schwangerschaft- oder Stillende Frauen, da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird.

3. KONTRAINDIKATIONEN
- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Insulinbedarf verändern kann;
- Personen, welche folgende Medikamente einnehmen:
* Theophyllin (zur Behandlung von Atemproblemen)
* Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie).

4. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

5. KONTRAINDIKATIONEN
- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Insulinbedarf verändern kann;
- Personen, welche folgende Medikamente einnehmen:
* Theophyllin (zur Behandlung von Atemproblemen)
* Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
* Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie).

6. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

7. VERHINDERUNG NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

8. PROBLEMLÖSUNG
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

9. PROBLEMLÖSUNG
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

10. PROBLEMLÖSUNG
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft oder zu stark verwenden, können mehrere der folgenden Nebenwirkungen auftreten:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen);
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenbeschwerden
- Schluckauf
- Verstopfte Nase
- Erbrechen
- Arrhythmien in der Brust
- Abnormaler Herzschlag

Sicherheitsfunktionen:

Überhitzungsschutz	Auf dem Bildschirm blinkt "TO / 0" 10 Mal.
Kurzschlussschutz	Auf dem Bildschirm erscheint "ISE" ✔ und "R" 3 Mal.
Unterspannungsschutz	Auf dem Bildschirm erscheint "LV" ✔ und vor dem Ausschalten des Geräts 10 Mal.
Überspannungsschutz	Das Gerät kann nicht aufgeladen werden.
Überladeschutz	Auf dem Bildschirm wird "5" angezeigt.

SICHERHEITSHINWEISEN FÜR DIE BEDIENER
Verwenden Sie keine nicht auffüllbaren Batterien.
Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSHINWEISEN FÜR WARTUNG DER SPULEN
Berühren Sie die Spule oder den Docht nicht mit den Fingern. Trinken oder essen Sie keine Dinge (z. B. Spule), die verbrennen könnten, stehen Sie 5 Minuten nach dem Auffüllen stehen, damit die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSHINWEISEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht-austauschbaren Batterien.
Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSHINWEISEN FÜR DIE ENTSORGUNG
Werfen Sie das Produkt und die Batterien nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie das Produkt und seine Komponenten an den dafür vorgesehenen Sammelstellen.

GESUNDHEITSWARNUNG
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein kranke Leute oder an Krankheiten leiden, die das Herz-Kreislauf-System betreffen.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr. Wenn die Nebenwirkungen nach dem Aufhören mit der Verwendung andauernt, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Contenu :
1* Gotek Nano Batterie
1* Pod Gotek (2.0 mL 0.6Ω)
1* Câble Type-C
1* Manuel de l'utilisateur

Vue éclatée :

Caractéristiques :
Dimensions : 80.5*17.2*20 mm
Capacité du pod : 2.0 ml
Pod compatible : résistance maillée de 0.6 Ω, non remplaçable
Pod Compatibilité : Compatible avec Gotek Pod - Compatible avec Gotek recharge Pod 0.8Ω (1.0Ω) et Gotek Pod 1.0Ω
Capacité de la batterie intégrée : 1000 mAh
Débit d'air : Débit d'air intérieur réglable
Mode de vapotage : Vapotage automatique
Mode de sortie : Courant voltage Sortie à tension constante 5.4W
Port de charge : Type-C
Courant de charge maximum : 1A

Remplissage du pod :
1. Tirez le réservoir du pod
2. Remplissez le pod par en silicone et ajoutez le e-liquide à travers le trou de remplissage
3. Remettez le bouchon en silicone dans le trou de remplissage
4. Replacer le pod à son emplacement

Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil

Instructions :

Appareil	Statut du voyant et détail
Connexion / déconnexion du pod	L'écran affiche la batterie actuelle et ✔
Connexion du pod	L'écran affiche la batterie actuelle et ⚡
Verrouillage / déverrouillage	L'appareil entre dans un état verrouillé après 7 secondes continu de fonctionnement. Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton d'alimentation pour déverrouiller. L'écran affichera le niveau actuel de la batterie et l'icône ✔.
Complètement chargé	L'écran s'allumera pendant 5 secondes et s'éteindra.
Charge complète	L'écran affichera le niveau actuel de la batterie et l'icône ⚡ clignotera.
Connexion au câble USB Type-C	L'appareil passera de la charge en fonction d'attente.
Si vous voulez en charge, la batterie cesse de se charger pour garantir la sécurité.	L'écran s'éteindra.

Caractéristiques de sécurité :

Vaping Over-Time Protection (Ots)	L'écran clignotera "TO / 0" 10 fois.
Protection contre les courts-circuits	L'écran clignotera "ISE" ✔ et "R" 3 fois.
Protection contre la décharge profonde	L'écran clignotera avec la batterie à 0 % et l'icône ✔ clignotera avant que l'appareil ne s'éteigne complètement après 10 secondes.
Protection de survoltage	L'appareil ne peut pas être chargé.
Protection contre la surchauffe	L'écran s'allumera pendant 5 secondes et s'éteindra.

Chargement :

Courant de charge maximum	1A
Tension de charge de sécurité maximale	5.4V
Courant de charge de sécurité maximale	1A
Charge complète	L'écran affichera le niveau actuel de la batterie et l'icône ⚡ clignotera
Connexion au câble USB Type-C	L'appareil passera de la charge en fonction d'attente
Si vous souhaitez charger, la batterie cesse de se charger pour garantir la sécurité	L'écran s'éteindra

Dispositifs de sécurité :

Protection contre les courts-circuits	L'écran clignotera "ISE" ✔ et "R" 3 fois.
Protection contre la décharge profonde	L'écran clignotera avec la batterie à 0 % et l'icône ✔ clignotera avant que l'appareil ne s'éteigne complètement après 10 secondes.
Protection de survoltage	L'appareil ne peut pas être chargé.
Protection contre la surchauffe	L'écran s'allumera pendant 5 secondes et s'éteindra.

Chargement :

Courant de charge maximum	1A
Tension de charge de sécurité maximale	5.4V
Courant de charge de sécurité maximale	1A
Charge complète	L'écran affichera le niveau actuel de la batterie et l'icône ⚡ clignotera
Connexion au câble USB Type-C	L'appareil passera de la charge en fonction d'attente
Si vous souhaitez charger, la batterie cesse de se charger pour garantir la sécurité	L'écran s'éteindra

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LUTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE

Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE
Si vous utilisez un e-liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques s'elle est consommée par voie orale, en particulier chez les tout-petits.

Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou d'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. RISQUES ET MISES EN GARDE RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine ne sont pas recommandés pour :
- Les non-fumeurs
- Les personnes n'ayant pas atteint l'âge légal
- Femmes enceintes ou allaitantes, car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel.

3. CONTRE-INDICATIONS
- Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général, tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les

maladies de la gorge à long terme, les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui affecte l'hypertension).
- Ceux qui souffrent de diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang.
- Ceux qui prennent les médicaments suivants :
* Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
* Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
* Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

4. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous n'av